


疾患別診療計画書

病名:

治療: TACE(肝動脈化学塞栓術)・TAI【肝動脈内(アイエーコール)注入化学療法】による加療



月日	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	
経過	入院日～治療前日	治療前日	治療当日【予定:午前・午後・未定】	治療後1日目	治療2日目～退院
内服薬	持参薬をお預かりし 内服続行か主治医に 確認します。		内服薬については主治医の指示を 確認し看護師が説明します。		
検査				採血があります。	
処置		両側臍径部の毛剃りを し足の甲(足背動脈)に しるしをつけます。	治療前に尿の管を入れます。	医師が穿刺部消毒を行い 看護師が尿の管を抜きます。	穿刺部消毒をします。
注射・点滴			治療前左腕に点滴を入れます。 血管造影室に行く前に肩に軽い麻酔の注射をして ストレッチャーでご案内します。 治療中気分が悪い等の症状がある時はお知らせしてくだ	点滴は主治医の指示の 時間まで行います。	
食事	制限はありませんが主治医の指示で治療食に なることもあります。		当日禁食となります。 帰室後より飲水はできます。	食事開始(食事内容)については 看護師が説明します。	
安静	制限はありません。		治療後1時間は穿刺部に1Kgの砂嚢をのせます。 その後、異常がなければ砂嚢を除去します。 5時間は仰向けで、その後異常が無ければ寝返り可と なります。 翌朝までベッド上安静です。	病棟内は自由です。	制限はありません。
清潔	入浴できます。			体拭きと更衣をします。	シャワー浴できます。
説明	治療について主治医より説明があります。 入院中の生活について看護師より説明がありま		腹痛、発熱、吐き気など苦痛症状出現時は 我慢せずお知らせ下さい。		
退院後の治療計画 退院後の日常生活の注意点	<ul style="list-style-type: none"> ・刺激物、アルコールは避け、規則正しく3食摂りましょう。 ・食後は休息をとり、肝臓を休めましょう。 ・穿刺部は強くこすらないようにして下さい。 				