

## 【皮下注】DARA-Kd(多発性骨髄腫)

(初回)1コース:28日

Rp	薬剤	投与量	投与時間	投与ルート		
					1	2
1	デキサメタゾン	19.8mg	15分	点滴静注	●	
2	ダラツムマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ	1800mg/30000単位	3~5分	皮下注	●	
3	グラニセトロン	3mg	15分	点滴静注	●	●
4	カルフィルゾミブ	20mg/m <sup>2</sup>	30分	点滴静注	●	●
5	カルフィルゾミブ	56mg/m <sup>2</sup>	30分	点滴静注		

■ レナデックス d2、9、16:20mg d22:40mg 内服

(2コース目)1コース:28日

Rp	薬剤	投与量	投与時間	投与ルート		
					1	2
1	デキサメタゾン	19.8mg	15分	点滴静注	●	
2	ダラツムマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ	1800mg/30000単位	3~5分	皮下注	●	
3	グラニセトロン	3mg	15分	点滴静注	●	●
4	カルフィルゾミブ	56mg/m <sup>2</sup>	30分	点滴静注	●	●

■ レナデックス d2、9、16:20mg d22:40mg 内服

(3~6コース目)1コース:28日

Rp	薬剤	投与量	投与時間	投与ルート		
					1	2
1	デキサメタゾン	19.8mg	15分	点滴静注	●	
2	ダラツムマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ	1800mg/30000単位	3~5分	皮下注	●	
3	グラニセトロン	3mg	15分	点滴静注	●	●
4	カルフィルゾミブ	56mg/m <sup>2</sup>	30分	点滴静注	●	●

■ レナデックス d2、8、9、16:20mg d22:40mg 内服

(7コース目以降)1コース:28日

Rp	薬剤	投与量	投与時間	投与ルート		
					1	2
1	デキサメタゾン	19.8mg	15分	点滴静注	●	
2	ダラツムマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ	1800mg/30000単位	3~5分	皮下注	●	
3	グラニセトロン	3mg	15分	点滴静注	●	●
4	カルフィルゾミブ	56mg/m <sup>2</sup>	30分	点滴静注	●	●

■ レナデックス d2、8、9、15、16:20mg d22:40mg 内服

Day				
8	9	15	16	22
●		●		
●		●		●
●	●	●	●	
●	●	●	●	

Day				
8	9	15	16	22
●		●		
●		●		●
●	●	●	●	
●	●	●	●	

Day			
8	9	15	16
		●	
		●	
●	●	●	●
●	●	●	●

Day			
8	9	15	16
●	●	●	●
●	●	●	●